

NOTA DE PREMSA

MÚTUATERRASSA ACULL LA LECTURA D'UNA TESI DOCTORAL SOBRE LA PATOGÈNIA I ELS TRACTAMENTS ANTIPARASITARIS EN LA INFECCIÓ INTESTINAL

*L'ha defensat Ander Burgaña Agoües, metge especialista
en Medicina Familiar i Comunitària del CAP Sant Cugat*

L'edifici docent de MútuaTerrassa ha acollit aquest matí l'acte de **defensa de la tesi doctoral "Estudi de la patogènia i dels tractaments antiparasitaris en la infecció intestinal per *Dientamoeba fragilis*"**, desenvolupada per **Ander Burgaña Agoües**, metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària del CAP Sant Cugat.

El **Dr. Tomàs Maria Pérez Porcuna**, cap dels Serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Regió Metropolitana Barcelona Sud (Agència de Salut Pública de Catalunya) s'ha encarregat de dirigir-la juntament amb la **Dra. Rosa Mari Abellana Sangra**, professora titular de Fonaments Clínics de la Universitat de Barcelona. La mateixa **Dra. Abellana** ha estat la seva tutora.

El tribunal ha estat format pel **Dr. Julià González Martín**, microbiòleg de l'Hospital Clínic i professor agregat de la Universitat de Barcelona (president); la **Dra. Laura Gavalda Mestre**, cap del Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics de l'Agència de Salut Pública (vocal) i la **Dra. Yamile Zabana Abdo**, cap clínic del servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i coordinadora de la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (secretària).

El treball en qüestió, el qual ha rebut una qualificació d'excel·lent, **té com a objectiu** analitzar la relació entre la càrrega parasitària de *Dientamoeba fragilis* i la simptomatologia gastrointestinal així com avaluar l'eficàcia dels principals tractaments antiparasitaris per establir criteris de maneig clínic.

A tall de conclusions, la tesi corrobora que existeix una associació significativa entre la càrrega parasitària elevada i la simptomatologia clínica. També estableix que la paromomicina (PMM) -antibiòtic d'ampli espectre- és més eficaç que el metronidazol (MTZ) -antimicrobià emprat per tractar les infeccions bacterianes i protozoàries- per eradicar el paràsit, tot i que alguns casos poden resoldre's espontàniament. Finalment, el treball destaca la necessitat de poder disposar d'un algoritme diagnòstic i terapèutic clar per guiar el maneig clínic d'aquesta infecció prevalent.

Més informació: Comunicació Corporativa MútuaTerrassa / comunicacio@mutuaterrassa.cat / [@Mutua_Terrassa](https://twitter.com/Mutua_Terrassa)