

NOTA DE PREMSA

MÚTUATERRASSA ACULL LA LECTURA D'UNA TESI DOCTORAL SOBRE L'ÚS DE LES DIFERENTS TÈCNIQUES ENDOSCÒPIQUES PER TRACTAR LES ESTENOSIS A LA MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL

L'ha defensat Xavier Andújar Murcia, adjunt a la Unitat d'Endoscòpia digestiva del Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí

L'edifici docent de MútuaTerrassa ha acollit aquest matí l'acte de **defensa de la tesi doctoral "Tractament endoscòpic de la malaltia inflamatòria intestinal: valoració de l'eficàcia i seguretat de les diferents tècniques endoscòpiques i del seu cost-eficàcia"**, desenvolupada per **Xavier Andújar Murcia**, adjunt a la Unitat d'Endoscòpia digestiva del Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí. La **Dra. Carme Loras**, cap del servei de l'Aparell Digestiu de l'HUMT, s'ha encarregat de dirigir-la juntament amb la **Dra. Maria Esteve** ex cap del servei i actual metgessa adjunta. La mateixa **Dra. Esteve** ha estat la seva tutora.

El tribunal ha estat format per la **Dra. Elena Ricard**, cap de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) de l'Institut de Malalties Digestives i Metabòliques de l'Hospital Clínic (presidenta); la **Dra. Miriam Mañosa**, cap de secció de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (secretària) i el **Dr. Carlos Guarner**, director de la Unitat d'Endoscòpia Digestiva del Servei de Patologia Digestiva de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (vocal).

El treball en qüestió, el qual ha rebut una qualificació d'excel·lent, està format per dos estudis (TEDEII i ProtDilat) i **persegueix dos objectius: d'una banda avaluar l'efectivitat i la seguretat de la Dilatació Endoscòpica amb el Baló (DEB) a les estenosis de la MII en hospitals amb diferents nivells de complexitat i determinar quins factors es relacionen amb l'èxit terapèutic de la tècnica i, de l'altra, comparar l'eficàcia, seguretat i costos de la DEB i de la col·locació d'una Pròtesi Metàl·lica Autoexpandible Totalment Coberta (PMATC) en el tractament d'estenosis a la Malaltia de Crohn.**

A tall de conclusions, els resultats de la tesi mostren que la DEB és segura i eficaç per al tractament de les estenosis intestinals en pacients amb MMI independentment del nivell de complexitat del centre i és -a més- la tècnica d'elecció en comparació a les PMATC. També es van identificar 5 factors associats amb l'èxit terapèutic de la dilatació: l'èxit tècnic, la no utilització de fàrmacs anti-TNF en el moment de la DEB i presentar una longitud curta de l'estenosi.

Finalment, el treball també conclou que, tot i que la DEB i la col·locació de la PMATC son segures i eficaces pel tractament de les estenosis a la MC, **la DEB presenta una millor eficàcia clínica i un menor cost mitjà en comparació amb la PMATC.**

Més informació: Comunicació Corporativa MútuaTerrassa / comunicacio@mutuaterrassa.cat / [@Mutua_Terrassa](https://www.instagram.com/Mutua_Terrassa)

Terrassa, 17 de desembre del 2025